

Coagulación Infrarroja (IRC) Tratamiento de Hemorroides Instrucciones de Preparación

Sobre la coagulación infrarroja:

La coagulación infrarroja (IRC) se realiza principalmente en un entorno de oficina para tratar las hemorroides. La mayoría de los pacientes suelen tolerarla bien, y tiene efectos secundarios limitados. Una pequeña sonda entra en contacto con el área por encima de la hemorroide, exponiendo el tejido a una ráfaga de luz infrarroja durante aproximadamente un segundo. Esto coagula las venas por encima de la hemorroide haciendo que se encoja y retroceda. El paciente puede sentir una sensación de calor muy brevemente, pero generalmente no es doloroso. Por lo general, no se requiere anestesia.

¡Lea todas las instrucciones DETENIDAMENTE!

- Póngase en contacto con nuestra oficina en el **303-604-5000** si tiene preguntas o dudas.

2 días antes del examen:

- Adquiera un Fleet Enema en la farmacia.**
- Si tiene tendencia a constiparse, **debería comprar dos enemas.**

El día de su examen:

- Todos los medicamentos deben tomarse como siempre.
- De 1 a 1 ½ hora antes de salir de casa:** póngase el primer enema. Espere el mayor tiempo posible, hasta 20 minutos, y luego expúlselo. Permítase descansar unos minutos. Repita con el segundo enema si usted tiene una tendencia hacia el estreñimiento, y de nuevo no lo retenga más de 20 minutos.
- NO COMA NI BEBA NADA TRAS PONERSE LOS ENEMAS.**

*** **Si cree que la preparación no está funcionando, llame a nuestra oficina al 303-604-5000.** ***

Requisitos del aviso de cancelación del procedimiento:

- Las cancelaciones de procedimientos deben realizarse **tres (3) días hábiles antes de su cita.**
- Si no se proporciona el aviso previo requerido, se cobrará una **tarifa de cancelación total de 50 \$.**