

Cápsula de permeabilidad endoscopia

instrucciones de preparación

Acerca de la cápsula de permeabilidad:

Una cápsula de permeabilidad es una cápsula soluble que se ingiere para verificar la permeabilidad de su tracto gastrointestinal. Esto es especialmente importante antes de recibir una cápsula endoscópica, si su proveedor sospecha de estenosis/estrechamiento en el intestino delgado.

Detalles de la llegada:

- Por favor, regístrese entre: **07:45 - 08:00**
- Si llega después de las 08:00, NO podremos proceder con la endoscopia con cápsula de permeabilidad.**
- Debería planificar estar en nuestras instalaciones durante **al menos 10 minutos.**

Información sobre medicamentos:

Agonistas GLP-1:

- **Agonistas GLP-1 (inyectables):** incluyendo Mounjaro (tirzepatide), Zepbound (tirzepatide), Trulicity (dulaglutide), Victoza, Saxenda (liraglutide), Ozempic (semaglutide), Wegovy (semaglutide), Bydureon BCise (exenatide), Byetta (exenatide), suspenda una semana antes de su examen.
- **Agonistas GLP-1 (orales):** incluyendo Rybelsus (semaglutide tablet), suspenda 24 horas antes del examen.

Instrucciones para la insulina y el control del azúcar en la sangre:

- **Insulinas de acción prolongada** (por ejemplo, Lantus, Basaglar, Semglee, Toujeo, Soliqua, Insulin Glargine): Disminuya la tasa basal a la mitad el día antes y el día de su examen.
- **Insulina de acción rápida y de acción corta regular** (por ejemplo, Lispro, Humalog, Admelog, Insulin regular): Si su nivel de azúcar en la sangre está alto y necesita hacer una corrección, tome la mitad (50%) de su dosis habitual de corrección. Esto se aplica al día antes y al día de su examen.
- **Bomba de insulina:** Disminuya la tasa basal a la mitad el día antes y el día de su examen. No administre dosis en bolo.
- **Contrólese el nivel de azúcar en la sangre en los mismos intervalos de siempre y, además, si es necesario:** Si su nivel de azúcar en la sangre es menor de 60, tome tabletas de glucosa en cualquier momento antes de su examen con un pequeño sorbo de agua.

Instrucciones para otros medicamentos que reducen el azúcar en la sangre:

- **Inhibidores SGLT2:** incluyendo Jardiance (empagliflozin), Brenzavvy (bexagliflozin), Glyxambi (empagliflozin/linagliptin), Invokamet (canagliflozin/metformin), Invokana (canagliflozin), Qtern (dapagliflozin/saxagliptin), Segluromet (ertugliflozin/metformin), Steglatro (ertugliflozin), Steglujan (ertugliflozin/sitagliptin), Synjardy (empagliflozin/metformin), Inpefa (sotagliflozin), Trijardy (empagliflozin/linagliptin/metformin), Xigduo (dapagliflozin/metformin), Farxiga (dapagliflozin), suspenda estos medicamentos 4 días antes de su examen.
- **Otros medicamentos que ayudan a controlar el azúcar en la sangre:** incluyendo Glucophage (metformin), Glucotrol/Glynase Pres Tab/Micronase (glipizide), Amaryl (glimepiride), DiaBeta (glyburide), Tradjenta (linagliptin), Januvia (sitagliptin), Nesina (alogliptin), Onglyza (saxagliptin), Zituvio (sitagliptin), Actos (pioglitazone), Avandia (rosiglitazone) or any combination of these medications, suspenda estos medicamentos el día antes de su examen.

Lista de Verificación Para Garantizar Una Preparación Adecuada

Para garantizar la finalización adecuada de su procedimiento, le sugerimos encarecidamente que **IMPRIMA** este documento y marque cada una de las instrucciones a medida que las complete.

5 días antes de su procedimiento:

- Por favor, póngas en contacto con nuestra clínica en el **303-604-5000** si se siente constipado. Le informaremos de cualquier requisito especial que podamos pedirle que haga.

Lista de verificación: el día antes de su examen

- Puede tomar un desayuno regular por la **mañana**, pero después de las 09:00, empiece una dieta de **líquidos claros**.
- Puede tomar líquidos claros **hasta las 22:00, pero NO alimentos sólidos**.
- DESPUÉS de las 22:00, no ingiera NADA**, ni siquiera medicamentos.
- NO fume ni mastique tabaco en las 24 horas previas al examen**, podría causar problemas con el procedimiento.
- Las tablas a continuación le mostrarán ejemplos de lo que puede y no puede beber:

LÍQUIDOS CLAROS - PUEDE BEBER:

Gatorade, Pedialyte, Powerade, Kool-Aid
Gatorade G2, Propel, Crystal Light
Paletas
Gelatina, jugo sin pulpa (por ejemplo, jugo de manzana)
Café negro
Té, agua
Refrescos transparentes (por ejemplo, Sprite, Ginger Ale)
Agua con gas

NO BEBA:

NO líquidos de color rojo o púrpura
NO leche ni cremas no lácteas
NO alcohol
NO caldo o sopa
NO jugo con pulpa (por ejemplo, jugo de piña)
NO líquido a través del cual no pueda ver
NO puré de manzana
NO batidos

Lista de verificación: el día de su examen

- No tome** medicación **antes de las 10:00** el día del examen.
- NO llegue al examen después de las 08:00**. No podremos proceder si lo hace.
- En la clínica ingerirá la cápsula de permeabilidad. Recibirá una orden de rayos X para obtener una radiografía abdominal 24 horas después de ingerir la cápsula de permeabilidad. Dependiendo de estos resultados, su proveedor decidirá si podemos proceder con una cápsula endoscópica.
- Puede tomar líquidos claros 2 horas después de ingerir la cápsula.**
- Puede tomar comidas ligeras 6 horas después de ingerir la cápsula.**

Instrucciones/expectativas después del examen

- Tras ingerir la cápsula y hasta que se excrete, no debería acercarse a ningún campo electromagnético, como un dispositivo de resonancia magnética o un aparato de radio (ham).
- No se preocupe** si no excreta la cápsula, a veces ocurre.
- Dependiendo de los resultados de los rayos X, le contactaremos para discutir los pasos de cómo proceder. **Si no tiene noticias nuestras en 48 horas** desde el momento en que se realizó la radiografía, comuníquese con nuestra clínica: **303-604-5000**.

¡Ha terminado con su preparación — excelente trabajo!

Traiga los siguientes artículos con usted a su examen:

- Una lista de todos sus medicamentos (incluso aquellos que compra sin receta médica)
- Una identificación con foto
- Su tarjeta de seguro
- Tarjeta de pago para su copago, coseguro o deducible

Requisitos de aviso de cancelación del procedimiento:

- La cancelación del procedimiento debe realizarse **tres (3) días hábiles antes de su cita**.
- Si no proporciona el aviso previo requerido, se aplicará **una tarifa total de cancelación de \$75**.